

В. И. РУДСКИЙ

НЕКОТОРОЕ ОБОБЩЕНИЕ ФОРМУЛ ПЕРЕДАЧИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ КООРДИНАТ И АЗИМУТА

Полученные нами ранее [1] формулы передачи астрономических координат и азимута с одного пункта триангуляции на другой в одностороннем треугольнике справедливы для случая, когда треугольник лежит справа от линии, по которой производится передача или, иными словами, если последовательная передача координат и азимута в треугольнике происходит по ходу часовой стрелки.

Делая выводы, аналогичные прежним, мы убедимся, что при передаче астрономических координат и азимута, например, с пункта А на пункт С (рис. 1), то есть при обходе вершин треугольника в процессе передачи против хода часовой стрелки, формулы примут вид:




Рис. 1.

$$\begin{aligned} \cos \varphi_3 \cos \lambda_{1,3} &= \cos z_{3,1} (\sin \varphi_1 \cos \alpha_{1,3} \sin z_{1,3} - \cos \varphi_1 \cos z_{1,3}) - \\ &- L_2 [\sin \varphi_1 (\cos \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} - \cos \alpha_{1,3} \sin z_{1,3} \cos A_1) - \\ &- \cos \varphi_1 (\cos z_{1,2} - \cos z_{1,3} \cos A_1)] - M_2 [\sin \varphi_1 (\sin \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} \cos z_{1,3} - \\ &- \sin \alpha_{1,3} \cos z_{1,2} \sin z_{1,3}) - \cos \varphi_1 \sin z_{1,2} \sin z_{1,3} \sin \alpha_1] \\ \cos \varphi_3 \sin \lambda_{1,3} &= -\sin \alpha_{1,3} \sin z_{1,3} \cos z_{3,1} + L_2 (\sin \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} - \\ &- \sin \alpha_{1,3} \sin z_{1,3} \cos A_1) - M_2 (\cos \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} \cos z_{1,3} - \cos \alpha_{1,3} \cos z_{1,2} \sin z_{1,3}); \\ \sin \varphi_3 &= -\cos z_{3,1} (\cos \varphi_1 \cos \alpha_{1,3} \sin z_{1,3} + \sin \varphi_1 \cos z_{1,3}) + \\ &+ L_2 [\cos \varphi_1 (\cos \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} - \cos \alpha_{1,3} \sin z_{1,3} \cos A_1) + \\ &+ \sin \varphi_1 (\cos z_{1,2} - \cos z_{1,3} \cos A_1)] - M_2 [\cos \varphi_1 (\sin \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} \cos z_{1,3} - \\ &- \sin \alpha_{1,3} \cos z_{1,2} \sin z_{1,3}) + \sin \varphi_1 \sin z_{1,2} \sin z_{1,3} \sin \alpha_1] \end{aligned}$$

и

$$\sin \alpha_{3,1} = \frac{(\cos \varphi_1 \cos z_{1,3} - \sin \varphi_1 \cos \alpha_{1,3} \sin z_{1,3}) \sin \lambda_{1,3} - \sin \alpha_{1,3} \sin z_{1,3} \cos \lambda_{1,3}}{\sin z_{3,1}} \quad (1)$$

Здесь

$$L_2 = \frac{\cos z_{3,2} - \cos z_{3,1} \cos A_3}{\sin A_1 \sin A_3}, \quad M_2 = \frac{\sin z_{3,1} \sin z_{3,2} \sin \alpha_3}{\sin A_1 \sin A_3}.$$

Формулу (1) запишем в ином виде. Для этого умножим обе ее части на $\cos \varphi_3$. После преобразований получим:

$$\begin{aligned} \sin \alpha_{3,1} = \frac{1}{\cos \varphi_3 \sin z_{3,1}} \{ & L_2 [\cos \varphi_1 (\sin \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} \cos z_{1,3} - \\ & - \sin \alpha_{1,3} \cos z_{1,2} \sin z_{1,3}) + \sin \varphi_1 \sin z_{1,2} \sin z_{1,3} \sin \alpha_1] - \\ & - M_2 [\cos \varphi_1 (\cos \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} - \cos \alpha_{1,3} \sin z_{1,3} \cos A_1) + \\ & + \sin \varphi_1 (\cos z_{1,2} - \cos z_{1,3} \cos A_1)] \}. \end{aligned}$$

В общем случае для одиночного треугольника можем записать:

$$\begin{aligned} \cos \varphi_2 \cos \lambda_{1,2} = & \cos z_{2,1} (\sin \varphi_1 \cos \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} - \cos \varphi_1 \cos z_{1,2}) + \\ & + L_1 [\sin \varphi_1 (\cos \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} \cos A_1 - \cos \alpha_{1,3} \sin z_{1,3} + \\ & + \cos \varphi_1 (\cos z_{1,3} - \cos z_{1,2} \cos A_1))] + \\ & + M_1 [\cos \varphi_1 \sin z_{1,2} \sin z_{1,3} \sin \alpha_1 \mp \sin \varphi_1 (\sin \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} \cos z_{1,3} - \\ & - \sin \alpha_{1,3} \cos z_{1,2} \sin z_{1,3})]; \\ \cos \varphi_2 \sin \lambda_{1,2} = & - \sin \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} \cos z_{2,1} - L_1 (\sin \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} \cos A_1 - \\ & - \sin \alpha_{1,3} \sin z_{1,3}) \mp M_1 (\cos \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} \cos z_{1,3} - \\ & - \cos \alpha_{1,3} \cos z_{1,2} \sin z_{1,3}); \\ \sin \varphi_2 = & - \cos z_{2,1} (\cos \varphi_1 \cos \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} + \sin \varphi_1 \cos z_{1,2}) - \\ & - L_1 [\cos \varphi_1 (\cos \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} \cos A_1 - \cos \alpha_{1,3} \sin z_{1,3}) - \\ & - \sin \varphi_1 (\cos z_{1,3} - \cos z_{1,2} \cos A_1)] + \\ & + M_1 [\sin \varphi_1 \sin z_{1,2} \sin z_{1,3} \sin \alpha_1 \pm \\ & \pm \cos \varphi_1 (\sin \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} \cos z_{1,3} - \sin \alpha_{1,3} \cos z_{1,2} \sin z_{1,3})]; \\ \sin \alpha_{2,1} = & \frac{1}{\cos \varphi_2 \sin z_{2,1}} \{ L_1 [\cos \varphi_1 (\sin \alpha_{1,2} \cos z_{1,2} \sin z_{1,3} - \\ & - \sin \alpha_{1,3} \sin z_{1,2} \cos z_{1,3}) \mp \\ & \mp \sin \varphi_1 \sin z_{1,2} \sin z_{1,3} \sin \alpha_2] \pm M_1 [\cos \varphi_1 (\cos \alpha_{1,3} \sin z_{1,3} - \\ & - \cos \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} \cos A_1) + \sin \varphi_1 (\cos z_{1,3} - \cos z_{1,2} \cos A_1)] \}, \end{aligned} \quad (2)$$

где

$$L_1 = \frac{\cos z_{2,3} - \cos z_{2,1} \cos A_2}{\sin A_1 \sin A_2}, \quad M_1 = \frac{\sin z_{2,1} \sin z_{2,3} \sin \alpha_2}{\sin A_1 \sin A_2}. \quad (3)$$

В формулах (2) и (3) индексы обозначают:

- 1 — исходный пункт;
- 2 — определяемый пункт;
- 3 — третий пункт треугольника.

При этом верхний знак в формулах ставится в том случае, когда треугольник расположен справа от стороны 1—2, а нижний — когда треугольник располагается слева от нее.

Запишем выражения (2) в ином виде. Для этого воспользуемся рис. 2. Представим, что треугольник ABC лежит в плоскости рисунка.

Вокруг некоторой точки O этой плоскости построим вспомогательную полусферу, основание которой на рисунке изображено окружностью. Из каждого пункта треугольника перенесем в точку O параллельно самим себе отвесные линии, которые в пересечении с полусферой дадут точки k_1, k_2, k_3 . Стороны треугольника $k_1 k_2 k_3$ представляют собой дуги $u_{i,n}$ равные углам между отвесными линиями. Через O проведем визирные прямые в направлениях $A \rightleftharpoons B, A \rightleftharpoons C, B \rightleftharpoons C$, а также вертикальные плоскости.

Обозначим через $K_{i,n}$ угол сферического треугольника, лежащий против стороны $z_{i,n}$ (дуги зенитного расстояния с пункта i на пункт n).

Согласно формулам сферической тригонометрии, запишем, например:

$$\cos K_{1,3} = \frac{\cos z_{1,3} - \cos z_{1,2} \cos A_1}{\sin z_{1,2} \sin A_1}, \quad (4)$$

$$\sin K_{1,3} = \frac{\sin z_{1,3} \sin a_1}{\sin A_1}. \quad (5)$$

Используя соотношения вида (4) и (5), выражения (2) после ряда преобразований запишем так:

$$\begin{aligned} \cos \varphi_2 \cos \lambda_{1,2} &= \sin z_{2,1} \{ \sin \varphi_1 [\cos \alpha_{1,2} \cos z_{1,2} \cos (K_{1,3} - K_{2,3}) \pm \\ &\quad \pm \sin \alpha_{1,2} \sin (K_{1,3} - K_{2,3})] + \cos \varphi_1 \sin z_{1,2} \cos (K_{1,3} - K_{2,3}) \} + \\ &\quad + \cos z_{2,1} (\sin \varphi_1 \cos \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} - \cos \varphi_1 \cos z_{1,2}); \\ \cos \varphi_2 \sin \lambda_{1,2} &= - \sin \alpha_{1,2} \sin z_{1,2} \cos z_{2,1} - \\ &\quad - \sin z_{2,1} [\sin \alpha_{1,2} \cos z_{1,2} \cos (K_{1,3} - K_{2,3}) \mp \cos \alpha_{1,2} \sin (K_{1,3} - K_{2,3})]; \\ \sin \varphi_2 &= \sin z_{2,1} \{ \sin \varphi_1 \sin z_{1,2} \cos (K_{1,3} - K_{2,3}) - \\ &\quad - \cos \varphi_1 [\cos \alpha_{1,2} \cos z_{1,2} \cos (K_{1,3} - K_{2,3}) \pm \\ &\quad \pm \sin \alpha_{1,2} \sin (K_{1,3} - K_{2,3})] \} - \cos z_{2,1} (\sin \varphi_1 \cos z_{1,2} + \\ &\quad + \cos \varphi_1 \cos \alpha_{1,2} \sin z_{1,2}); \\ \sin \alpha_{2,1} &= \frac{ - [\sin \alpha_{1,2} \cos (K_{1,3} - K_{2,3}) \mp \cos \alpha_{1,2} \cos z_{1,2} \sin (K_{1,3} - \\ &\quad - K_{2,3})] \cos \varphi_1 \mp \sin \varphi_1 \sin z_{1,2} \sin (K_{1,3} - K_{2,3}) }{ \cos \varphi_2 } \end{aligned} \quad (6)$$




Рис. 2.

Но, согласно рис. 2,

$$K_{1,3} - K_{2,3} = \gamma_{1,2}, \quad (7)$$

где $\gamma_{1,2}$ — угол между взаимными вертикальными сечениями в пунктах A и B .

Это соотношение справедливо для случая, когда треугольник находится справа от линии передачи. Если же передачу координат и азимута производить по той же стороне, но в противоположном направлении, то треугольник будет расположен с левой стороны. Так как величина угла γ между взаимными вертикальными сечениями по данной стороне не зависит от направления передачи, то, учитывая принятые ранее обозначения индексов, во втором случае будем иметь:

$$\gamma_{1,2} = K_{2,3} - K_{1,3} \quad (8)$$

или

$$\gamma_{1,2} = -(K_{1,3} - K_{2,3}). \quad (9)$$

И тогда для обоих случаев передачи координат и азимута, согласно (7) и (9), из выражения (6) получим:

$$\begin{aligned} \sin \varphi_2 &= \sin \varphi_1 (\sin z_{1,2} \sin z_{2,1} \cos \gamma_{1,2} - \cos z_{1,2} \cos z_{2,1}) - \\ &\quad - \cos \varphi_1 [\cos \alpha_{1,2} (\cos z_{1,2} \sin z_{2,1} \cos \gamma_{1,2} + \sin z_{1,2} \cos z_{2,1}) + \\ &\quad + \sin \alpha_{1,2} \sin z_{2,1} \sin \gamma_{1,2}; \\ \sin \lambda_{1,2} &= \frac{-\sin \alpha_{1,2} (\cos z_{1,2} \sin z_{2,1} \cos \gamma_{1,2} + \sin z_{1,2} \cos z_{2,1})}{\cos \varphi_2} + \\ &\quad + \frac{\cos \alpha_{1,2} \sin z_{2,1} \sin \gamma_{1,2}}{\cos \varphi_2} \\ \sin \alpha_{2,1} &= \frac{\cos \varphi_1 (\cos \alpha_{1,2} \cos z_{1,2} \sin \gamma_{1,2} - \sin \alpha_{1,2} \cos \gamma_{1,2})}{\cos \varphi_2} - \\ &\quad - \frac{\sin \varphi_1 \sin z_{1,2} \sin \gamma_{1,2}}{\cos \varphi_2}. \end{aligned} \quad (10)$$

Из сказанного можно сформулировать следующее правило для вычисления угла γ :

Угол $\gamma_{1,2}$ между взаимными вертикальными сечениями в пунктах 1 и 2 вычисляется по формуле (7). При этом 1—2 — то направление, относительно которого треугольник, служащий для вычисления $\gamma_{1,2}$, лежит справа.




Рис. 3.

В качестве примера реализации этого правила воспользуемся звеном триангуляции, состоящем из двух треугольников (рис. 3). Из рисунка видно, что угол $\gamma_{1,2}$ между взаимными вертикальными сечениями в пунктах 1 и 2 смежной стороны треугольников может быть вычислен как из треугольника $123'$, лежащего справа от направления 1—2, так и из треугольника $123''$, лежащего слева от этого направления.

Тогда, согласно сформулированному правилу, можем написать, что

$$\gamma_{1,2} = K_{1,3'} - K_{2,3'} \quad (11)$$

$$\gamma_{2,1} = \gamma_{1,2} = K_{2,3'} - K_{1,3'}. \quad (12)$$

Углы γ вообще очень незначительны (порядка величин уклонений отвесных линий). В этом случае, ограничиваясь первыми членами разложений функций $\gamma_{1,2}$, после простого преобразования (10) представим в таком виде:

$$\begin{aligned} \sin \varphi_2 &= -\sin \varphi_1 \cos(z_{1,2} + z_{2,1}) - \\ &\quad - \cos \varphi_1 \left[\cos \alpha_{1,2} \sin(z_{1,2} + z_{2,1}) + \frac{\gamma_{1,2}''}{\rho''} \sin \alpha_{1,2} \sin z_{2,1} \right]; \\ \sin \lambda_{1,2} &= \frac{-\sin \alpha_{1,2} \sin(z_{1,2} + z_{2,1}) + \frac{\gamma_{1,2}''}{\rho''} \cos \alpha_{1,2} \sin z_{2,1}}{\cos \varphi_2}; \\ \sin \alpha_{2,1} &= -\frac{\cos \varphi_1 \left(\sin \alpha_{1,2} - \frac{\gamma_{1,2}''}{\rho''} \cos \alpha_{1,2} \cos z_{1,2} \right) + \frac{\gamma_{1,2}''}{\sigma''} \sin \varphi_1 \sin z_{1,2}}{\cos \varphi_2}. \end{aligned} \quad (13)$$

Из этих формул и из предыдущих выводов видно, что наибольший объем вычислений приходится на угол γ , который находим из выражений (4), (5), (7), и (5) работы [1].

ЛИТЕРАТУРА

1. Рудский В. И. Передача астрономических координат с одного пункта на другой. Республиканский межведомственный научно-технический сборник «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», вып. 2. Изд-во Львовского ун-та, 1965.

Работа поступила
26 октября 1965 г.